

Qutenza® 179 mg kutanes Pflaster

Wirkstoff: Capsaicin.

Zusammensetzung: Jedes kutane Pflaster mit einer Fläche von 280 cm² enthält:

Wirkstoff: 179 mg Capsaicin entsprechend 640 Mikrogramm Capsaicin pro cm²

Pflaster. Sonstige Bestandteile - Pflaster: *Matrix:* Silikonklebstoffe,

Diethylenglycolmonoethylether (Ph.Eur.), Dimeticon 12500 cSt, Ethylcellulose N50 (E462); *Trägerschicht:* Polyester-Trägerfolie, Drucktinte mit Pigmentweiß 6;

Abziehbare Schutzfolie: Polyester-Schutzfolie; sonstiger Bestandteil mit bekannter

Wirkung - Reinigungsgel: Butylhydroxyanisol (Ph.Eur.) (E320) (0,2 mg/g) sonstige

Bestandteile - Reinigungsgel: Macrogol 300, Carbomer 1382, Gereinigtes Wasser, Natriumhydroxid (E524), Natriumedetat (Ph.Eur.).

Anwendungsgebiete: Behandlung von peripheren neuropathischen Schmerzen bei Erwachsenen entweder allein oder in Kombination mit anderen Arzneimitteln gegen Schmerzen.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: *Sehr häufig (≥ 1/10):* an der Stelle an der das Pflaster angewendet wird: Schmerzen, Rötung. *Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10):* Brennendes Gefühl; Schmerzen in Gliedmaßen; an der Stelle an der das Pflaster angewendet wird: Juckreiz, Pusteln, Blasen, Schwellung, Trockenheit. *Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100):* Gürtelrose (Herpes zoster); vermindertes Geschmackempfinden; verringertes Gefühl in Gliedmaßen; Augenreizung; zu schneller, zu langsamer oder ungewöhnlicher Herzschlag (Atrioventrikulärer Block (AV-Block) ersten Grades, Tachykardie, Palpitationen); Husten; Rachenreizung; Übelkeit; Juckreiz; Muskelkrämpfe; erhöhter Blutdruck; Schwellung von Gliedmaßen; an der Stelle an der das Pflaster angewendet wird: Quaddeln, Kribbelgefühl, Entzündung, erhöhtes oder vermindertes Gefühl in der Haut, Hautreaktion, Reizung, Hautblutungen. *Nicht bekannt (Häufigkeit kann anhand der vorliegenden Daten nicht bestimmt werden):* Hautverbrennungen zweiten Grades; versehentliche Exposition (einschließlich Augenschmerzen, Augen- und Rachenreizung und Husten); tiefe Rötung an der Stelle an der das Pflaster angewendet wird; Blasenbildung/Nässen der Haut; sehr berührungsempfindliche, geschwollene, feuchte oder glänzende Haut. In klinischen Studien an gesunden Probanden wurden vorübergehende leichte Veränderungen der Wärmewahrnehmung (1°C bis 2°C) und stechende Empfindungen festgestellt.

Warnhinweise: Reinigungsgel enthält Butylhydroxyanisol. Vor Anwendung Packungsbeilage beachten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerhinweis: Flach liegend im Originalbeutel und Umkarton aufbewahren. Nicht über 25°C lagern. Nach dem Öffnen des Beutels innerhalb von 2 Stunden anwenden.

Verschreibungspflichtig. Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- und Gebrauchsinformation.

Stand der Information: 03/2019

Grünenthal GmbH • 52099 Aachen • Deutschland